# 【滴合檢測人十】

如你有以下任何一個或以上的糖尿病高危 因素,必須盡早接受【糖尿病預測及診斷 服務】:

- ✓ 有糖尿病家族中 (直系親屬:父母、子女、兄弟姐妹)
- 前期糖尿病#/曾有高血糖紀錄
- 年齡 45 歳或以上
- ✓ 曾有懷孕期血糖偏高 / 妊娠性糖尿病
- 曾生育四公斤或以上嬰兒
- 肥胖或中央肥胖
- ✓ 患有心臟病、中風、高血壓、高血脂、 多囊卵巢綜合症
- 缺乏運動
- 吸煙 (包括已戒煙人士)

#### #前期糖尿病:


血糖值超過正常水平,但未能界定為糖尿病, 包括『空腹血糖異常』及『葡萄糖耐受不良』。 有研究顯示,每年約有 11% 前期糖尿病的人 士發展成糖尿病。此外,患有前期糖尿病比正 常血糖人士增加 1.5 倍患上心臟病的風險。

### 【檢測項目】

- 個人及家族病歷中、藥物中
- 糖尿病風險評估
- 血液分析:
  - 75 克口服葡萄糖耐量測試 (空腹及兩小時後血糖)
  - 糖化血红素
  - **血全圖**
- 身體檢查:
  - 量度肥胖指數
  - 量度血壓

#### 75克口服葡萄糖耐量測試

\*1mmol/L=18mg/gL



#### 糖化血紅素(HbA1c) (不重売脂抽血及無刻可的實驗完益測)

(下而至陂畑皿)及腔記可的貝闕至怓侧/	
糖尿病	≥ 6.5%
糖尿病前期	5.7%-6.4%
正常血糖	< 5.6%

#### 【檢測報告】

- 中糖尿專科醫生簽署的檢測報告
- 建議跟谁行動
- 完善健康生活模式



#### 【預約檢查】

請於辦公時間內,親臨本中心或致電 2647-8806 預約。亦可诱禍電郵 vckdac@cuhk.edu.hk 聯絡本中心職員安排 預約。

### 【檢查費用】

港幣600元\*(香港身分證持有人士) \*本中心會員享有折扣優惠 港幣1,200元(非香港身分證持有人士)

#### 【健康教育活動】

本中心亦設有多元化的健康教育活動, 『健康飲食烹飪班』、『糖尿病看圖對話』 及『專題工作坊』,詳情請向本中心職員 查詢或瀏覽中心網頁。

American Diabetes Association. Screening for type 2 diabetes. Diabetes Care 2004 (27 Suppl 1); S11-14.

International Diabetes Federation Western Pacific Regional Office. Plan of Action (2006-2010). Manila, Philippines, 2008. [3] Alberti KG, Zimmet P, Shaw J: International Diabetes Federation: a concensus on Type 2 diabetes prevention. Diabet Med 24:451-463, 2007.

American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes. Diabetes Care 2010: 33 (Suppl 1):S11-S61

American Diabetes Association: L Classification and Diagnosis. Diabetes Care 2013;36(suppl 1):S1

# 【糖尿病預測及診斷服務】

糖尿病是一種慢性疾病,估計香港 有十分之一的人口患上糖尿病;而其中 估計有半數未知自己患病。亦有研究顯 示香港華人的糖尿病病發率逐漸上 升,而且有年輕化的趨勢。早期的糖尿 病可能沒有任何症狀,所以會被忽略, 延誤治療,以致身體器官受損,出現各 種的併發症。

本地研究指出,曾患妊娠性糖尿病 的婦女在生產後 15 年內,較沒有奸娠 性糖尿病的婦女,患糖尿病的風險高出 8倍。而肥胖的人,尤其有中央肥胖的 人士(即脂肪積聚於腹腔內)較易患有 胰島素抗阳,引致高血脂、高血糖和血 管栓塞等代謝綜合症。若脂肪不斷積 存,患上糖尿病和心血管病的風險可以 較正常人高2至4倍。

【糖尿病預測及診斷服務】是專為 容易患上糖尿病的人十而設,希望及早 診斷出糖尿病,讓患者接受適當的治 療,避免病情加深。曾患妊娠性糖尿病 之婦女,亦建議在生產後六星期及定期 進行糖尿病預測及診斷。

根據國際建議指引,所有已確診為 糖尿病的人士則應每12-18個月進行一 次全面的【糖尿病併發症檢測】。

- Diabetes Prevention Program Research Group. (2002). Reduction in the Incidence of Type 2 Diabetes with Lifestyle Intervention
- Metformin. New England Journal of Medicine, 346(6): 393-403.

  Wild S, Roglic Q, Green A, Sicree R, King H. Global prevalence of diabetes: estimates for the year 2000 and projections for 2030

#### 威爾斯親干醫院 Prince of Wales Hospital



# 交涌連接:

港鐵 - 馬鞍山綫第一城站

九巴路線 - 73A. 80K. 84M. 85A. 86. 89X - 威爾斯親王醫院 九巴路線 - 49X, 82X, 83X, 83S, 281A, A41 - 第一城港鐵站

九巴路線 - 48X(於城門隧道轉乘九巴49X)

九巴路線 - 269D(於沙田鐵路站轉乘九巴80K、86或89X)

城巴路線 - 182,61R,62R,88R - 沙田第一城

專線小巴路線 - 804號, 808號, 811號, 811A號 - 威爾斯親王醫院

### 辨公時間:

星期一至四 上午八時四十五分 至 下午五時卅分 上午八時四十五分 至 下午五時四十五分 星期六、日及公眾假期休息





香港中文大學 香港糖尿病及肥胖症研究所 丘中傑糖尿病檢測中心

# 糖尿病預測 及診斷服務



地址:香港 新界 沙田 威爾斯親王醫院 職員宿舍B座四樓

電話:(852) 2647-8806 傳真:(852) 2947-8495

網址: http://yckdac.hkido.cuhk.edu.hk 電郵: yckdac@cuhk.edu.hk